

Frykter hummeren forsvinner

På 1950-tallet ble det fanget opptil 1200 tonn hummer i året. I dag er fangsten redusert til 30 tonn. Myndighetenes dårlige forvaltning av bestanden får skylden for at hummerbestanden er på et historisk lavnivå.

Leder i Norske Hummeroppdretteres Interesseorganisasjon (NHI), Asbjørn Drenstvig, mener ytterste konsekvens er at hummeren kan bli helt borte fra norske farvann.

– Hummerbestanden i Norge er i dag sterkt overbeskattet. Det blir registrert historisk lave fangster og undersøkelser indikerer en kritisk lav gytebestand. Hovedårsaken til dette er en feilslått forvaltning hvor det blant annet har vært et for lavt minstemål for fangst. Dermed har individer som egentlig skulle bidratt til rekruttering blitt fisket opp, sier Drenstvig.

Verdens beste

Drenstvig viser til at minstemålet for hummer fanget langs norskekysten er 22-25 centimeter.

– Hummeren blir kjønnsmoden når den er 24-25 centimeter. Klekkeklare hummer kan med andre ord fanges, noe som ikke gir egenproduksjon.


– På dette området har altså forvaltningen vært akterutseilt i forhold til biologien til hummeren. Den norske hummeren er verdens beste, og representerer et betydelig potensial for Norge. Vi har ikke råd til å miste den helt, advarer Drenstvig.

NHI er svært bekymret over den kraftige reduksjonen i hummerbestanden siden tidlig på 1950-tallet, da det ble fanget mellom 1000 og 1200 tonn i året. Bunnivået ble nådd i 1992, da det bare ble tatt 25 tonn. De siste årene har fangsten ligget på om lag 30 tonn.

Dødelig bakterie

Fra tidligere er det kjent at også den amerikanske hummeren truer den norske stammen.

– Det har vært rapport om flere fangster av amerikansk hummer i norske farvann. Dette kan medføre store konsekvenser for norsk hummer på to områder: For det første har forsøk vist at den amerikanske hummeren utkonkurrerer den norske hummeren, og dermed kan overta dens naturlige vekstområder. For det andre har utbrudd



TRUSSEL: Amerikansk hummer en av truslene mot den norske hummerbestanden.
Foto: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

av bakteriesykdommen gaffkemi vist seg å stamme fra import av levende hummer. Gaffkemi er 100 prosent dødelig for den norske hummeren, mens den amerikanske tåler en infeksjon bedre og kan dermed være bærer av sykdommen, forklarer Drenstvig.

Årsaken til at amerikansk hummer har havnet i norske farvann, er trolig at det ble dumpet en kasse levende hummer fra Aker Brygge i Oslo i 1987.

Krever tiltak

NHI krever nå at norske forvaltningsmyndigheter innfører tiltak for å redde den norske hummeren:

- Forbud mot innførsel av levende amerikansk hummer.
- Forbud mot fangst og omsetning av norsk rognhummer til konsum.
- Iverksetting av et statlig initiativ

som skal bidra til å gjenoppbygge den norske hummerbestanden.

– Disse tiltakene vil bidra til en bedre og mer bærekraftig forvaltning av den dyrebare ressursen som den norske hummeren representerer for kystsamfunnene langs norskekysten. En mer effektiv ressursforvaltning vil også sikre en økt avkastning i hummerfiske. Det bør derfor utarbeides en samlet og konkret strategiplan for fremtidig hummerforvaltning, sier Asbjørn Drenstvig.

– Bakgrunn

RUNAR NØRSTAD,
journalist i ANB